

Регламенты применения

Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Норма расхода, л, кг/га	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработки)
Пшеница	Клоп вредная черепашка	0,1-0,15	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)
	Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица	0,1	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)
Ячмень	Пьявица	0,1	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)
Рапс (семена, масло), горчица (кроме горчицы на масло)	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	0,1-0,15	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)

Регламенты применения

Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Норма расхода, л, кг/га	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработки)
Картофель	Колорадский жук	0,07-0,1	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)
Горох	Гороховая зерновка, гороховая плодоярка, гороховая тля	0,1	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	20(1)
Пастбища	Саранчовые	0,15	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3 дней после обработки. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	-(1)
Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, тли	0,15-0,2	Опрыскивание в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	-(1)