



สารกำจัดโรคพืช

“ไม่พุงกระอาย ละลายน้ำดี ยับยั้งเชื้อราที่ดื้อต่อสารเคมี”

ชื่อสามัญ	โดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph) 50% WP
กลุ่มสารเคมี	Cinnamamide [กลุ่ม 40]
จุดเด่น	โดมอร์ สามารถป้องกันและกำจัดเชื้อราโดยยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของเชื้อรา ทำให้เชื้อราไม่สามารถเจริญเติบโตและตายในที่สุด โดมอร์ มีประสิทธิภาพดีทั้งในด้านป้องกันและกำจัดเชื้อราที่ดื้อต่อสารชนิดอื่น เช่น เชื้อราสาเหตุจากโรคราน้ำค้างและโรคไฟทอปเทอร่า โรครากเน่าโคนเน่า
ประโยชน์	ใช้ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ (<i>Late blight</i>) ในมันฝรั่งที่มีสาเหตุจากเชื้อรา <i>Phytophthora infestans</i> ใช้ป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้าง (<i>Downy mildew</i>) ในพืชตระกูลแตง ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา <i>Pseudoperonospora cubensis</i>
อัตราการใช้	โรคใบไหม้ อัตราใช้ 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบอาการโรคใบไหม้ทุกๆ 7 วัน และหยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน โรคราน้ำค้าง โรคไฟทอปเทอร่า อัตราใช้ 10-20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร เริ่มพ่นเมื่อพบการระบาดของโรค และพ่นซ้ำทุก 7 วัน



โรคใบไหม้ในมันฝรั่ง



โรคราน้ำค้าง



โรคไฟทอปเทอร่า

