



สารกำจัดโรคพืช

“แทรกซึมไว อุ่นใจกว่า คุ้มครองผลผลิต”

ชื่อสามัญ	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin) 25% EC
กลุ่มสารเคมี	Methoxycarbamate [กลุ่ม 11]
จุดเด่น	กาแลค มีคุณสมบัติเป็นสารดูดซึมและแทรกซึมเข้าต้นพืชได้รวดเร็ว ระยะปลอดฝนสั้นเคลื่อนย้ายในต้นพืชได้ดี กาแลค ออกฤทธิ์ทั้งการป้องกัน การรักษา และยับยั้งการสร้างสปอร์ของเชื้อรา ดูดซึมเข้าสู่พืชได้อย่างรวดเร็ว สามารถซึมผ่านผิวใบด้านบน สู่ใต้ใบได้ จึงส่งผลให้ผิวใบมันวาวและช่วยให้ผลไม้มีขนาด กาแลค ลดความเครียดในพืช เมื่อพืชเจอสภาพแล้งหรือสภาพที่ไม่เหมาะสม กาแลค ช่วยการสังเคราะห์แสงคลอโรฟิลล์ทำให้พืชเขียวโตไว ส่งผลให้พืชสามารถสะสมพลังงานและธาตุอาหาร ทำให้ปริมาณรากเพิ่ม ปริมาณดอกเพิ่ม มีผลผลิตที่สมบูรณ์
ประโยชน์	ใช้ป้องกันกำจัดโรคกาบใบแห้งในข้าว โรคใบไหม้แผลใหญ่ (northern leaf blight) ในข้าวโพดหวาน ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา <i>Exserohilum turcicum</i> โรคสแคปองุ่นที่มีสาเหตุจากเชื้อรา <i>Sphaceloma ampelinum</i> โรคยางไหลในแคนตาลูปและในพืชตระกูลแตง ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา โรคใบจุด โรคใบจุดสีม่วง โรคแอนแทรคโนส โรคกุ้งแห้งพริก โรคราสนิม โรคราสีชมพู โรคใบติดทุเรียน และ ชัดผิวลำไย โรคสแคปในพืชตระกูลส้ม พืชอื่นๆ
อัตราการใช้	ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค และครั้งที่สองหลังจากพ่นครั้งแรก 10 วัน



โรคกาบใบแห้งในข้าว



โรคกุ้งแห้งพริก

โรคใบไหม้แผลใหญ่
(ข้าวโพด)

ราสีชมพูทุเรียน

