



สารกำจัดวัชพืช

“ไม่ฟุ้งกระจาย ละลายน้ำดี”

ชื่อสามัญ	ไดยูรอน (diuron) 80% WG
กลุ่มสารเคมี	Urea [กลุ่ม C2]
จุดเด่น	เรนบอรอน คือสารกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย สับปะรด เรนบอรอน มีฤทธิ์ดูดซึมทั้งทางรากและใบ เคลื่อนย้ายสู่ปลายยอดผ่านท่อน้ำ เรนบอรอน ออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์แสงที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต ทำให้วัชพืชใบเลี้ยงและแห้งตาย
ประโยชน์	ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในอ้อย สับปะรด เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบเช่น หญ้าตีนนก หญ้าตีนติด หญ้าดอกขาวเล็ก และหญ้านกสีกสมพู่ วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักโขม จิงจ้อ และผักโขมหนาม
อัตราการใช้	ใช้อัตรา 300-450 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตรต่อไร่ พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 75-115 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังปลูกอ้อย ขณะดินมีความชื้น



หญ้านกสีกสมพู่



หญ้าตีนกา



ผักโขมหนาม



ผักเบี้ยหิน



น้ำนมราชสีห์

