

พินโต

Pinto



สารกำจัดวัชพืช

“ยาคุมเลน หมดปัญหาวัชพืชในนาข้าว”

ชื่อสามัญ	เพรทิลาคลอร์ (pretilachlor) 30% EC
กลุ่มสารเคมี	Chloroacetamide [กลุ่ม K3]
จุดเด่น	พินโต คือสารป้องกันและกำจัดวัชพืชในนาหว่านน้ำตม ทั้งใบแคบ ใบกว้าง และ กก พินโต เติ้นหญ้าดอกขาว ปลอดภัยต่อหน่อข้าว หน่อไม่หัก พินโต ข้าวไม่แดง ไม่งัน ข้าวเจริญเติบโตดี
ประโยชน์	ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก และหญ้าดอกขาว วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และวัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก
อัตราการใช้	ใช้อัตรา 250-300 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 65-75 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 3 วัน ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออก และรดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน



กกขนา



ผักปอดนา



หญ้าดอกขาว



หญ้าข้าวนก



หญ้ากระดุกโก

